

1911

DIE VARICEN

UND IHRE

CHIRURGISCHE BEHANDLUNG

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

DER

MEDIZINISCHEN FAKULTÄT DER K. B. FRIEDRICH-
ALEXANDERS-UNIVERSITÄT ZU ERLANGEN

VORGELEGT VON

FRANZ STADEL

AUS ROTTENBURG AM NECKAR

Tag der mündlichen Prüfung: 21. November 1917



LEIPZIG
VERLAG VON F. C. W. VOGEL
1918.



DIE VARICEN

UND IHRE

CHIRURGISCHE BEHANDLUNG

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

DER

MEDIZINISCHEN FAKULTÄT DER K. B. FRIEDRICH-
ALEXANDERS-UNIVERSITÄT ZU ERLANGEN

VORGELEGT VON

FRANZ STADEL

AUS ROTTENBURG AM NECKAR

Tag der mündlichen Prüfung: 21. November 1917



LEIPZIG
VERLAG VON F. C. W. VOGEL
1918.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät.

Referent: Herr Professor Dr. Graser.

Dekan: Herr Professor Dr. Specht.

Wer einmal längere Zeit in der Praxis tätig war, der kann den Patienten, die wegen ihrer Krampfadern und Fußgeschwüre den Arzt in Anspruch nehmen, nachfühlen, was es heißt, jahre- und jahrzehntelang an ein- und demselben Leiden zu kranken, ohne dauernde Heilung zu erlangen, und kann es den bemitleidenswerten Patienten auch nicht so schwer verdenken, wenn sie von einem Arzt zum anderen wandern, um endlich ihr Leiden los zu werden. Das Schicksal dieser armen Patienten, die der Dermataloge, nachdem er Auslese gehalten hat, dem inneren Mediziner und dieser wieder dem Chirurgen überweist, ist treffender Weise mit der Lage der Heimatlosen verglichen worden und kann die Patienten zur Verzweiflung treiben. So beobachtete ich einen Fall, wo ein Patient mit *Ulcera cruris*, dem der Unterschenkel amputiert werden sollte, schwermütig wurde und durch *Suicidium* endete.

Wer in der Geschichte Umschau hält, dem kann es nicht entgehen, daß schon im grauen Altertume die Ärzte sich den Varicen und Fußgeschwüren angelegentlich gewidmet haben. Allerdings darf es uns nicht wundern, wenn eine richtige Therapie nicht Platz greifen konnte; denn die Lehre vom Kreislauf war noch nicht richtig erkannt. Es konnten deshalb auch einzelne Behandlungsarten, die den heutigen Methoden in mancher Hinsicht vorbildlich geworden sind, nicht zu der jetzigen Vollkommenheit ausgebildet werden, da ja jede Operation vor Einführung der Anti- und Asepsis mit mehr oder weniger Lebensgefahr verbunden war. In Betracht kommt hierbei auch die ungenügende Kenntnis vom Bau der Venen. Während bei den alten Römern die Vertreter der alexandrinischen Schule wie Herophilus, Galenus und Celsus die opera-

tive Behandlung der Varicen auf eine staunenswerte Höhe brachten, wurde im Mittelalter dieses Kapitel der Medizin ziemlich vernachlässigt und geriet so immer mehr und mehr in Vergessenheit. Genau wie heute, so hatten auch schon die Alten zwei Richtungen, die konservative Behandlung mit Verbänden, Salben oder Pudern und die operative, die sich die gänzliche oder teilweise Verödung und Ausrottung der erweiterten Venen zum Ziele gesteckt hatte.

Bevor ich jedoch zur Besprechung der einzelnen Behandlungsarten der Varicen und *Ulcera cruris* übergehe, dürfte es angezeigt erscheinen, etwas über die Anatomie der Venen und die Entstehung der Varicen zu sagen.

Bekanntlich fließt das Blut in den Venen zum Herzen zurück, die Blutsäule bewegt sich also in der unteren Extremität von der Großzehe zum Becken hin. Um ein Zurückfließen des Blutes zu verhindern, befinden sich normalerweise in der Vena femoralis nach der Einmündung der Saphena magna und in der Saphena magna vor ihrer Einmündung in die Vena femoralis Klappen, auf denen die ganze Blutsäule der Venen im Abdomen ruht und die ein Zurückfließen des Blutes verhindern, sowie den Blutdruck der ganzen Blutsäule von der Vena iliaca bis zum Fuße unterbrechen. Von der Einmündung der Vena femoralis ab befinden sich nach weiter oben, dem Herzen zu, keine Klappen mehr, wohl aber nach unten hin, in den sogenannten *Venae communicantes*. Außerdem hat man an der unteren Extremität zu unterscheiden zwischen Venen, die unter der Haut, den sogenannten oberflächlichen Venen, und den tieferen Venen, die zwischen und unter den Muskeln liegen, sowie den eben genannten *Venae communicantes*, die eine Verbindung zwischen beiden Arten darstellen und deren Zahl verschieden und klein ist. Während die tieferen Venen ihr Blut der Femoralis direkt zuführen, fließt das Blut der oberflächlichen Venen durch die Vena saphena magna der Vena femoralis zu. In den tieferen Venen wird der Lauf des venösen Blutes durch den Druck der Muskeln und die Muskelkontraktionen entschieden günstig beeinflusst, während die oberflächlichen Venen direkt unter der Haut und im Unterhautzellgewebe verlaufen und so den gleichmäßigen Druck der umliegenden Gewebe entbehren. Bei geringeren Druckschwankungen schon wird der Blutlauf in den oberflächlichen Venen ungünstig beeinflusst. Je nachdem nun diese Druckschwankung kürzere oder längere Zeit angehalten hat, oder öfters schon eingetreten ist und die Venenwände verändert sind, kann dieser Umstand für die oberflächlichen Venen dauernd schädliche Folgen haben, indem die Klappen an der Einmündungsstelle der Saphena magna schlußunfähig oder insuffizient werden. Daraus folgt, daß die Venen des Ober- und Unterschenkels nicht mehr, wie

normalerweise, ihr Blut in die Vena femoralis entleeren können; die Venenwände werden gedehnt und verharren in diesem ausgedehnten Zustand.

Welch großem Druck die Venenwände ausgesetzt sind, beweist selbsts Versuch. Während unter normalen Verhältnissen der Blutdruck in den Schenkelvenen 1 cm Hg beträgt, stieg er bei insuffizienten Klappen auf 16 cm, bei Anstrengung sogar auf 26 cm Hg. Schon die alten Autoren erblickten in der Blutdrucksteigerung die Entstehung der Varicen und Virchows Arbeiten haben diese Ansicht vollauf bestätigt. Diesem gesteigerten Druck können die Venenwände dann unter bestimmten Verhältnissen nicht mehr standhalten.

Die Bedingungen für die Drucksteigerung sind verschiedene; einestheils liegen sie außerhalb der Venen, andertheils in den Venen selbst. Die Bedingungen, die außerhalb der Venen liegen, sind in der Vermehrung des intraabdominellen Druckes und der Spannung der Bauchdecken zu suchen. Es kämen hier Schwangerschaft, große Tumoren, Leberechinokokken, sowie das vermehrte Pressen bei Obstipation; Prostatahypertrophie und Strikturen der Blase und des Mastdarms in Betracht. Insbesondere wird dieser Druck vermehrt durch körperliche Arbeiten in gebückter Stellung beim Vorhandensein eines der genannten Leiden. Ob den verpönten Strumpfbändern eine Rolle zukommt, ist nicht entschieden, andererseits ist es allgemein anerkannt, daß bei bestimmten Berufsarten die Varicen gehäuft vorkommen als bei anderen Berufen. So gelten Bäcker, Keller, Schmiede, Köchinnen, Wäscherinnen usw. als durch ihren Beruf für Varicen bevorzugt. Nach Carliers (7) Beobachtungen werden Varicen und deren Begleiterscheinungen durch mechanische Schäden und bestehende Nachgiebigkeit — die hereditär oder erworben sein können — der Venenwand hervorgerufen. Zu den mechanischen Schäden rechnet er nicht nur langes Stehen, wie es in den oben angeführten Berufen der Fall ist, sondern auch langdauernde Märsche, deren Folge Ermüdung der Muskeln sei; hierdurch würde der Blutrückfluß wegen des Mangels an Muskelkontraktionen verögert. Carlier findet eine Verschlimmerung geringfügiger Varicen durch den Militärdienst. Nach Carlier werden in Frankreich jährlich durchschnittlich 3000 Mann durch Varicen, die sich infolge des Militärdienstes verschlimmert haben, dienstuntauglich. Dieselbe Ansicht teilt auch Nobl (25), während Steinthal durch Gehen eine Besserung der Varicen, leider, soweit ich mich erinnern kann, nur in einem Falle beobachten konnte. So stehen die Ansichten oft gerade einander gegenüber. Seltener findet man, daß Narben den Transport des Blutes aus den Venen der unteren Extremität ungünstig beeinflussen.

Wir sehen also, daß es verschiedene Momente sind, welche die Entstehung der Varicen befördern, namentlich bei Individuen, die von Haus aus hierzu veranlagt sind. Nobl und Schnitzler erhärten

diese Beobachtungen durch die Tatsache, daß 12—13 jährige Mädchen, deren Mütter mit hochgradigen Varicen behaftet waren, schon vor der Pubertätszeit Varicen aufwiesen. Ebenso sind die Fälle, wo in mehreren Generationen einer Familie Varicen auftreten, keine allzu seltenen.

Während bei uns Varicen häufig vorkommen, berichtet Myauchi (23), daß die mongolische Rasse infolge der mehr sitzenden Lebensweise von Varicen ziemlich verschont sei. Es kämen also nicht nur hereditäre, sondern sogar Rassenunterschiede beim Vorkommen von Varicen in Betracht. Des weiteren finden sich Varicen nicht nur als Familienerbstück, sondern als erworbene Veränderung der Venenwände vor. Allgemein wird anerkannt, daß nach Typhus, Pneumonie, Scharlach, Staphylokokkeninfektion und Bleivergiftung, sowie bei Alkoholikern häufig Varicen beobachtet werden, die ihren Grund in der Strukturveränderung der Venenwände haben. Von den syphilitischen und anderen Venenerkrankungen kann ich Abstand nehmen, da sie bei den hier in Betracht kommenden Patienten ausscheiden.

Abgesehen von den Beschwerden, welche Varicen bedingen, möchte ich nicht unterlassen, auch auf die Gefahren, denen ein Varixträger ausgesetzt ist, hinzuweisen. Allgemein bekannt ist, daß besonders die Varixknoten der Knöchelgegend speziell im Alter, sei es durch äußere Gewalt (Quetschung, Stoß usw.) oder aber in Ruhe, im Anschluß an große Anstrengungen, gerne platzen und mitunter den Tod herbeiführen können. Ich brauche nur an das Ende von Kopernikus zu erinnern, der einem geplatzten Varixknoten zum Opfer fiel. Daß bei graviden Frauen in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft die Varixknoten gerne rupturieren und lebensgefährliche Blutungen hervorrufen können, möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Die Blutung muß nicht immer nach außen stattfinden, sie kann auch unter die Haut in das Gewebe erfolgen.

Wenn auch die Varicen selbst kaum als Unfall in Betracht kommen werden, so wird man doch öfters in die Lage versetzt werden, Varicen als Unfallfolgen z. B. nach großen Narben, oder Muskelzerreißen usw. anerkennen zu müssen. Varicocelen sind verschiedentlich vom Reichsversicherungsamt als Unfall gewertet worden. Ebenso müssen Ulcera bei bestehenden Varicen nach Stoß, Quetschung usw. öfters als Unfallfolgen anerkannt werden.

Was die Veränderung der Venenwände, die ein Auftreten der

Varicen ermöglichen, betrifft, so sind dieselben von den verschiedenen Untersuchern verschieden befunden worden.

M. B. Schmidt, Orth, Förster, Zanconi, Nobl u. a. finden, daß es sich um eine Erweiterung der Gefäße handelt, die nicht nur die Hauptstämme, sondern auch die Seitenäste bis in die Kutis hinein befällt. Mit der Erweiterung geht eine Verlängerung der Gefäße in ihrem Verlaufe einher. Es entstehen die verschiedenen Formen der Phlebektasie. Auf diese Weise kommen die Ausbuchtungen oder Schlingelungen, die sich häufig zu Konvoluten von Venen ausbilden, zustande. Der mikroskopische Befund ist jeweils verschieden, da die untersuchten Partien nicht in dem gleichen Stadium der Venenerweiterung und nicht aus denselben Stellen entnommen waren. Im wesentlichen handelt es sich um entzündliche Vorgänge, wobei die elastische Schicht schwindet und an ihre Stelle Bindegewebe tritt. Nobl, der über ein großes Material verfügt, schreibt hierzu: „Je nach dem Stadium der Entartung, der Form der untersuchten Ektasien, dem Standort der Gefäße und den sekundären Reizerscheinungen werden in der Muscularis und Intima bald einfache und entzündliche hyperplastische Veränderungen anzutreffen sein, bald wird die auf alle Gewebslagen ausgehende extreme, mit dem Schwunde der elastischen und muskulären Elemente einhergehende, keinerlei Anzeichen einer stattgehabten Entzündung darbietende Atrophie des Gewebssubstrates vorherrschen.“ Zanconi (38) hat sowohl die gesunde wie die kranke Vena saphena anatomisch untersucht und bei den varikös veränderten Venen regelmäßig folgenden Befund festgestellt. Die Veränderungen bestanden: „In einem verschiedenartig atrophischen Zustand der muskulären Zellfasern, in Fragmentation und Degeneration der elastischen Elemente, welche letztere sich durch eine Zernagung ihrer Ränder in dem Verlust ihrer normalen welligen Form kundgeben, dagegen unregelmäßig zusammengeballt, in Fragmenten oder Anhäufungen körnigen Aussehens angesammelt erscheinen.“ Daneben war in dem vermehrten interstitiellen Bindegewebe zu beobachten: „Feine, elastische, verschiedentlich als unregelmäßiges Netzgebilde scharf geränderte Elemente, die wahrscheinlich mit dem Bindegewebe neu gebildet sind.“

Während bis zu den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dem histologisch-pathologischen Bau der Venen beinahe alle Aufmerksamkeit gewidmet wurde, nahm die ganze Genesis der Varicen eine andere Wendung durch Trendelenburg (34). Es ist das hohe Verdienst dieses Mannes, folgende Beobachtung gemacht zu haben: Bringt man einen Patienten mit Varicen in horizontale Lage und komprimiert mit dem Finger kurz vor der Einmündung der Saphena magna in die Vena femoralis die Saphena

magna, nachdem durch Elevation und Streichen des Beines das venöse Blut entleert wurde, so füllt sich, nachdem der Patient sich aufgerichtet hat, die Saphena magna nur ganz allmählich mit Blut. Läßt man den Fingerdruck auf die Saphena magna in Wegfall kommen, so kann man mit dem bloßen Auge sehen, wie in die Saphena magna das Blut aus den zentral gelegenen Teilen einschießt und die Vene sich wieder mit Blut füllt und anschwillt. Diese Erscheinung nennt man nun allgemein den Trendelenburgschen Versuch, oder das Trendelenburgsche Phänomen. Der Versuch beruht auf einer Prüfung der Venenklappen auf ihre Schlußfähigkeit. Sind die Klappen undicht, insuffizient, so ist der Versuch positiv, d. h. das Blut schießt beim Nachlassen des Druckes in die Vene ein. Sein Assistent Perthes (29) gab für diese Tatsache den Beweis durch folgendes Experiment: Komprimiert man bei einem Patienten die Saphena und läßt ihn umhergehen, ohne durch Mitgehen die Kompression auszusetzen, so schwellen die zu Beginn gefüllten Venen nach einigem Gehen beträchtlich ab. Die Erklärung für diese Tatsache liege darin, daß durch die Muskelkontraktion beim Gehen die tiefen Venen die oberflächlichen Hautvenen sozusagen leerpumpen, d. h. das Blut in der Saphena läuft nicht durch ihre Einmündungsstelle direkt in die Femoralis, sondern schon vorher, auf dem Wege über die Venae communicantes. Auf diese Tatsache gestützt führte Trendelenburg seine Operation aus und war bahnbrechend auf dem Gebiete der Varicenbehandlung. Hesse (17) hat Bedenken geäußert, ob nun tatsächlich überall da, wo der Trendelenburgsche Versuch negativ ausfällt, die Klappen intakt seien, da ja das Trendelenburgsche Phänomen mit den Augen wahrgenommen werde und deshalb bei tiefer Lage der Saphena magna oder bei geringer Klappeninsuffizienz nicht konstatiert werden könnte. Nach Hesse gibt es viele Patienten mit Ulcera cruris, ohne daß Varicen sichtbar sind, trotzdem die Patienten insuffiziente Saphenaklappen haben. Um dies nachzuweisen, verfährt Hesse folgendermaßen: An der medialen Seite des Knies wird die äußerlich nicht sichtbare Saphena aufgesucht und mit einer Farbe (Jodtinktur) deren Verlauf gezeichnet. Patient kommt in horizontale Lage und nun wird wie beim Trendelenburgschen Versuch das Bein hochgehoben und das Blut aus der Saphena herausgestrichen.

Man wird in der Fossa ovalis die Saphena komprimiert und der Patient aufgerichtet. Zwei Finger der freien Hand werden auf die mit Farbe bezeichnete Stelle gelegt. Bei klappenschlußunfähiger Saphena fließt nun Blut zurück, was mit den Fingern genau abgenommen werden kann. Da es häufig surrende Wirbelgeräusche sind, so können diese mit dem Stethoskop nachgewiesen werden. Fällt der Versuch positiv aus, so ist die Schlußunfähigkeit der Saphenaklappe sicher erwiesen. Auf diese Weise können ganz geringe Grade von Klappeninsuffizienz nachgewiesen werden. Neben Hesse hat Hackenbruch noch eine andere Methode empfohlen, um die Schlußunfähigkeit der Saphenaklappen nachzuweisen. Wenn ein Patient mit unsichtbaren Venen hustet und dann auf die Saphena die Finger legt, so beobachtet man ein säuendes Schwirren in der Saphena. Hackenbruch legt dieses Schwirren als feine Erschütterungen der Venenwand aus, entstanden durch retrogrades Durchschießen der Blutwelle, die durch Husten hervorgerufen wurde. Beim normalen Menschen ist dieses Symptom auch nach Hesse nicht nachzuweisen. Zweifelsfrei beobachtete Trendelenburg diese Erscheinung auch, wenn nach ihm steigt Blutsäule in der Saphena, sobald Patient hustet oder preßt. Während also Hackenbruch die Insuffizienz der Vene palpatorisch nachweisen konnte, wies sie Trendelenburg mit dem Auge nach. Das Hessesche palpatorische Blutdruckstrom- und das Hackenbruchsche Durchspritzschwirrsymptom sind die einzigen Möglichkeiten, unsichtbare Varicen nachzuweisen:

Hackenbruch gab noch ein weiteres Symptom, den sogenannten Fluktuationsstoß an, um die Insuffizienz der Venenklappen zu konstatieren. Über den Fluktuationsstoß nach Hackenbruch sind die Meinungen geteilt. Hesse und Ledderhose widersprechen der Verwertbarkeit des Fluktuationsstoßes zum Nachweise der Saphena-Insuffizienz. Hackenbruch ging hier folgendermaßen vor: Klopft man auf die Saphena am Unterschenkel, so kommt die aufwärtsliegende Blutsäule in Bewegung. Es entsteht so am Oberschenkel in der Saphena ein deutlicher Fluktuationsstoß, was Hackenbruch als beweisend für Schlußunfähigkeit der Venenklappen bewertet haben möchte. Hesse und Ledderhose konnten den Fluktuationsstoß auch an Men-

schen mit klappenunfähigen Venenklappen, also bei negativer Trendelenburg beobachten, da der Blutstrom in zentripetalen Richtung erfolgt, dagegen ist ein Fluktuationsstoß in zentrifugale Richtung, also in umgekehrter Richtung als der Stoß nach Hackenbruch, für Schlußunfähigkeit beweisend. Dies hat schon 1885 Schwarz beschrieben, denn bei normaler Venenklappe ist eine Fortpflanzung der Blutwelle in zentrifugaler Richtung unmöglich. Beklopft man am Oberschenkel die Saphena und tritt am unteren Saphenaabschnitt Fluktuation ein, so ist das beweisend für Klappeninsuffizienz, und zwar je weiter unten die Fluktuation auftritt, desto entwickelter ist die Klappeninsuffizienz. Hackenbruch fühlt den Fluktuationsstoß zentripetal, also in der Blutstromrichtung, während bei Schwarz der Stoß zentrifugal, also dem Blutstrom entgegengesetzt erfolgt. Bei all diesen Symptomen spielen die Venenklappen die Hauptrolle. Weil in den anatomischen Lehrbüchern sich wenig über die Venenklappen findet, waren viele Autoren, die in den Varicen-Operationen tötlich angehend sein und andere bessere Operationen empfehlen wollten, vor allem darauf bedacht, das konstante Vorhandensein von Klappen nachzuweisen.

Am meisten geübt wird nach den Literaturangaben die Trendelenburgsche Operationsmethode. Sie besteht in der Unterbindung der Saphena vor ihrem Eintritt in die Vena femoralis.

So wurden im Zeitraum von $11\frac{1}{2}$ Jahren an der Tübinger Klinik [M. Goerlich] (12) 147 Saphenaunterbindungen an 108 Patienten vorgenommen; 69 Operationen, an 51 Patienten vorgenommen, wurden persönlich nachuntersucht. 29 gaben schriftlich Antwort, 28 gaben keine Nachricht, während 12 gestorben waren. Als dauernd geheilt gelten nur Patienten, die keinerlei Beschwerden — Geschwüre usw. — und eine dauernde Unterbrechung der Saphenabahn nachweisen konnten. Dieser Zustand fand sich nur bei 19 Patienten = 27,54 Proz. Alle anderen hatten trotz Unterbrechung der Saphena noch Beschwerden. Bei 47 Patienten hatte sich die Strombahn wieder hergestellt, und zwar zweimal durch Regeneration des Saphenastromes selbst, 21 mal durch Erweiterung der Kollateralen, 24 mal durch Ausbildung eines Venenkonvolutes in der Narbe selbst. Trotzdem waren fast alle Patienten mit dem Ergebnis der Operation zufrieden, obwohl der objektive Befund ein ungünstiger war. In 79 Proz. waren die subjektiven Beschwerden entweder bedeutend gebessert oder ganz geschwunden. 21 Proz. waren nach den subjektiven Klagen als Mißerfolg zu buchen. Perthes hatte nach seiner Statistik 22 Proz., Remedi 6 Proz.

Faisst 15 Proz. Rezidive bei der Operation nach Trendelenburg. Goerlichs Ansicht geht dahin, „daß man sich trotz der relativ wenig befriedigenden Resultate nicht abhalten lassen soll, Trendelenburgs Operation in allen geeigneten Fällen zu versuchen, bevor man eingreifendere Operationen vornimmt“.

Die Ansicht ist allgemein, daß die Trendelenburgsche Operation von den in letzter Zeit empfohlenen als eine der schonendsten ist und nur bei Varicen geringen Grades ohne Ulcera oder Ulcus cruris Erfolg verspricht. Die ursprüngliche Trendelenburgsche Operation bestand in der einfachen Unterbindung der Saphena im Ligamentum scarpae. Bald danach — jedenfalls infolge von Mißerfolgen — wurde die Trendelenburgsche Operation Modifikationen unterworfen, die in Excision von Teilstrecken und der ganzen Vene usw. bestanden.

Trotzdem gab es wieder Mißerfolge, die Viannay (36) durch Studium an Leichen erklären wollte. Er hat die Operation an Leichen durchgeführt und hernach sowohl retrograd als auch aufsteigend Injektionen vorgenommen, um durch Studium der Kollateralen die einzelnen Methoden bewerten zu können. Eine retrograde Füllung der Saphena von der Vena femoralis aus gelang selten infolge der an der Vena femoralis vorhandenen Klappe. Obwohl nun die Ergebnisse an der Leiche sich auf Lebende nicht ohne weiteres übertragen lassen, wenn die Rückstauung ist klinisch und manometrisch bewiesen, fand Viannay in 65 Proz. eine doppelte Saphena und in 47 Proz. im unteren Drittel des Oberschenkels eine Kollaterale. Viannay empfiehlt deshalb die Unterbindung und Resektion, die sich auf eine größere Strecke ausdehnen soll. Dabei ist auf eine zweite Vena Saphena interna zu achten und diese etappenartig zu unterbinden.

Die Mißerfolge bei der Trendelenburgschen Operation sind zum Teil bedingt durch die Tatsache, daß auch an der Einmündungsstelle der Venae communicantes sich Klappen befinden, die ein Zurückströmen aus den tiefer gelegenen Venen in die oberflächlichen verhindern sollen. Um alle diese Klappen und Verbindungswege zu sterilisieren und auszuschalten, ist die Madelungsche Operation empfohlen worden. Madelung ging so vor, daß er einfach in langen Hautschnitten, die den Varicen entlang laufen, alle erweiterten Venen durchtrennte und die langen Wunden durch die Hautnaht schloß. Ich muß sagen, daß dieses Verfahren wohl radikal ist, daß ihm aber doch Fehler anhaften, die andere Autoren von der Madelungschen Operation abhalten. Georges (14) tadelt an der Madelungschen Operation, daß bei derselben nur die varikösen Endausbreitungen, nicht aber der Stamm der Saphena getroffen werde, des weiteren seien zahlreiche Hautschnitte nötig und die durch die gestörten Zirkulationen

lationsverhältnisse krankhaft veränderte Haut biete nicht die günstigsten Heilungsaussichten. Eine der Madelung'schen ähnliche Operation übte Brodier (4). Er ging folgendermaßen vor: Die Saphena mit ihren zahlreichen Verzweigungen wird in ihrer ganzen Länge durch je 2 Incisionen am Ober- und Unterschenkel bloßgelegt, die auf ein Drittel ihres Weges nebeneinander verlaufen. Kuzmik (14) hat gegen die Operation seine Bedenken wegen der Größe der Wundfläche, der langen Zeitdauer der Operation selbst und der großen zurückbleibenden Narben. Obwohl Kuzmik meint, daß bei der Madelung'schen Operation Rezidive ausgeschlossen seien, referierte Gottschlich (15) auf der 200. Sitzung der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins über 40 Fälle, die nach der Madelung'schen Methode operiert wurden. Er hatte bei seiner Nachuntersuchung, die 7 Jahre nach der Operation stattgefunden, nur 80 Proz. Heilung. Außerdem machten sich die zurückbleibenden großen Narben häufig durch bedeutende Schmerzhaftigkeit unangenehm bemerkbar.

Coenen (8) empfahl, das in den Varicen gestaute Blut durch eine tiefe in die Vena poplitea einmündende Muskelvene in die tiefer gelegenen Venen ein- und abzuleiten. Coenen hält diese Venenanastomose für einfacher ausführbar als die Delbetsch-Saphena-femoral-Anastomose, da bei seiner Venenanastomose durch die Muskelkontraktion die Abflußbedingungen günstiger beeinflußt würden.

Coenen, der unabhängig von Delbet und den gleichzeitig erwähnenden Hesse und Schack (16) arbeitete, vereinigte das periphere Ende der Vena saphena mit dem zentralen Ende der Art. prof. fem. Er wollte aus der Saphena das kalte gestaute Blut durch warmes arterielles zurückdrängen und so für das bestehende Ulcus günstige Heilungsbedingungen stellen. Seine Ansichten waren irrig. Der Erfolg war nicht nur negativ, sondern das Bein schwoll an, so daß die Art. prof. fem., sowie die Vena saphena unterbunden werden mußten. Später machte Coenen die Venennaht in der Kniekehle. Er ließ die Vena saphena in die Vena tibialis postica einmünden und schaffte so eine neue Bahn durch die Vena femoralis.

Delbet, den ich eben erwähnte, empfahl ebenfalls eine eigene Operation. Seine Erwägungen waren folgende: Zwischen oberflächlichen und tiefen Venen sind der Anastomosen zu wenige; es müsse Wege zum Abfluß des sich stauenden Blutes geschaffen werden. Die will Delbet durch Überpflanzung der Vena saphena in eine andere Vene erreichen. Unterhalb der Einmündungsstelle der Saphena in die Vena femoralis liegen nach seiner Annahme in der Regel mehrere Klappen. Wird die Saphena eines Klappenpaares transplantiert, so wird durch die eingeschalteten Klappen der abnorme Druck von oben

aufgehalten und zugleich die Möglichkeit für einen normalen Fluß durch die neuangelegte Anastomose geschaffen. Delbet hat seine Operation gut ausgedacht und begründet, doch hat er außer Acht gelassen, daß, wie Kuzmik (19) gerechterweise tadelt, die Delbetsche Operation einen ganz gewandten Operateur erfordert, Kuzmik macht seine Bedenken dahin geltend, daß die Operation sehr gefährlich sei und sich bei derselben ungünstige anatomische Verhältnisse finden könnten, die z. B. eine Unterbindung der Vena saphenalis notwendig erscheinen ließen. Eine Unterbindung der Vena saphenalis dagegen kann lebensgefährlich werden.

Frangenheim berichtete auf dem Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie über einen Fall von Saphena-Femoralis-Anastomose, die nach $1\frac{1}{2}$ Jahre von Erfolg war. Hesse und Schack folgten nach der Idee Delbets. Da aber Delbet das Vorhandensein der Venenklappen nur annahm, wollte Schack Gewißheit über das Vorhandensein der Klappen haben. In anatomischen Lehrbüchern finden sich keine genauen Angaben über Sitz und Zahl der Venenklappen. Schack untersuchte an 100 Leichen die Klappenverhältnisse und die Entfernung der Klappen von der Einmündung der Saphena in die Femoralis von oben nach unten hin. Er fand, daß in der Vena femoralis sich unterhalb der Vena saphena stets Klappenpaare finden. Ein Klappenpaar war stets vorhanden, sonst 2—3 und mehr. Da das erste Klappenpaar meist 3—4 cm unterhalb der Saphenaeinmündung steht und nur in seltenen Fällen 10 cm, so wurde als geeignete Stelle für die vorzunehmende Anastomose eine Stelle an der Saphena gewählt, die 12—14 cm unterhalb der Saphenaeinmündung liegt. Das in der Saphena fließende Blut kommt nun unter dem Schutz des Klappenpaares in der Femoralis; können sich also die Venen gut entleeren und die erweiterten Venen zurückbilden. Auf Grund dieser Feststellungen — Delbet hatte die Klappen nur angenommen — wurden nun am Petersburger Pankow-Krankenhaus 23 Fälle operiert; 16 davon hatten Ulcera. In diesen 23 Fällen mußte ein Todesfall registriert werden wegen Sepsis (vermutlich durch nicht keimfreie Seide). Bei der Probeoperation, die Operation erfolgreich ist, muß Trendelenburg negativ ausfallen. Der Erfolg war, daß die Varicen allmählich verschwanden und die Ulcera sich zurückbildeten. Auch die subjektiven Beschwerden verschwanden. Die Indikationen, die Hesse und Schack aufstellten, sind ziemlich beschränkt. Es dürfen nur kräftige gesunde Leute mit valvulärer Insuffizienz der Saphena — Trendelenburg negativ — der Operation unterzogen werden. Die Varicen müssen im Bereich der Saphena liegen und ihr Stamm muß durchgängig sein. Von der Operation auszuschließen sind kranke schwache Leute mit positivem Trendelenburg — die Varicen sind nicht auf der Basis einer valvulären Insuffizienz entstanden. Entzündung und Thrombose

der zu anastomosierenden Gefäße, sowie Varicen, die nicht im Bereiche der Saphena liegen, kontraindizieren ebenfalls diese Operationsmethode. Ebenso bilden Fälle, bei denen eine Infektion der Lymphbahnen des Oberschenkels zu befürchten ist, z. B. mehrfach überstandenes Erysipel, schmierig entzündete Geschwüre, sowie starke sklerotische Veränderung der Saphena und Femoralis oder zu enges Kaliber eines der beiden Gefäße eine Kontraindikation für die Gefäßanastomose.

Diese Ausführungen zeigen deutlich, daß diese Operationsmethode nur beschränkt geübt werden kann. Sodann aber ist eine Gefäßnaht immer ein mit großen Gefahren verbundener Eingriff, der in keinem Verhältnis zum Leiden der hierzu sich eignenden Patienten steht, ganz abgesehen davon, daß es noch andere Operationsmethoden gibt, welche diese Gefahr nicht in sich schließen. Dobrowolskaja (8) gab eine Venennaht an, deren Zweck eine Erweiterung des Lumens der Gefäßanastomose ist. Die Operation ist fein durchdacht und schließt die gleichen Gefahren, nur in fast erhöhtem Grade wie die von Hesse und Schack geübte Operationsmethode in sich. Zu der Operation der Gefäßeinpflanzung äußert sich Unger (35) in dem Sinne, daß die Totalexstirpation so gute Erfolge gebe, daß man von einer Gefäßanastomose ruhig Umgang nehmen kann. Sein Vorschlag ist, alle jungen Leute mit Varicen zu operieren. Sämtliche varikös veränderte Gefäße sind zu entfernen. Er hat sogar bei Thrombophlebitis mit Erfolg operiert, stets hat die Trendelenburgsche Operation vorauszu gehen.

Während bei den Operationen nach Coenen, Delbet, Hesse und Schack die Thrombose lebensgefährlich werden kann und ihr Auftreten sehr unerwünscht ist, gibt es Autoren, die Operationen empfehlen, bei denen die Thrombose direkt bezweckt wird.

So empfiehlt Tavel (33) Karbolinjektionen, um Thrombose absichtlich zu erzeugen. Da nach der Trendelenburgschen Operation verschiedentlich Thrombose beobachtet wurde, kann man diesen Vorgang als natürlichen Heilungsprozeß bezeichnen, denn das Gefäßlumen wird obliteriert, also undurchgängig. Tavel macht zuers die Resektion der Saphena im Scarpaschen Dreieck oder die Ligatur nach seiner Methode. Nach 24 Stunden, spätestens 48 Stunden, fängt er mit 5 proz. Karbolinjektionen an. Mehr als 10 ccm spritzt er auf einmal nicht ein. Bei ausgedehnten Varicen hat er bis zu 50 Injektionen gegeben. Durch die Karbolinjektion gerinnt das Blut der Vene nicht sofort, sondern nur ganz allmählich; es bildet sich innerhalb 1—2 Tagen aus dem wandständigen ein vollständiger Thrombus. Selten beobachtete Tavel Fieber und das Allgemeinbefinden ist weniger bei der künstlichen als der spontanen Thrombose beeinflusst.

Gefahr der Fortpflanzung der Thrombose bis in die tiefen Venen nicht zu befürchten, denn Tavel beobachtete diese Erscheinung wie ja auch bei Phlebitis im Saphenagebiet ein Weiterschreiten der Entzündung in die tiefen Venen ein ziemlich seltenes Ereignis ist. Erscheinungen, die ein solches Weiterschreiten der Thrombose nahelegen, hat Tavel nie beobachtet. Bis zur völligen Wiederherstellung dauert es jedoch bei einzelnen Leuten 2—3 Monate. Außerdem eignet sich die Tavel'sche Methode für tiefe Varicen weniger. Tavel machte die Ligatur folgendermaßen: Mit einer krummen Nadel wird ein Seidenfaden unter der Vene durchgeführt und über der Vene durch die Einstichsstelle wieder herausgeführt. Die Schlinge, in welcher jetzt die Vene liegt, wird geknotet, die Enden abgeschnitten, eine Hautschnittlinie gehoben, so daß der Knoten einsinken und einheilen kann. Statt der Ligatur nach Tavel kann man auch die Ligatur nach Schede machen. Schede's perkutane Umstechung, die ebenfalls Kuzmik empfiehlt, besteht in einer mehrmaligen Umstechung der erweiterten Venen, ohne dieselben bloßzulegen. Durch Einlage von Gaze oder von zylindrischen Dochtstücken wurde die Methode verbessert, da der Druck unter dem Seidenfaden oft zu gering war, worüber aber der Seidenfaden Durchschneidungen verursachte. Mit der Umstechung wird zentral mit dicken Seidenfäden begonnen. Die Einstich- und Ausstichstelle liegt etwa $\frac{1}{2}$ cm vom Rand der Varix entfernt. Die Umstechung wird sofort geknotet und geht bis auf die Hautoberfläche; an der Einmündung eines Seitenastes liegt wieder eine Umstechung, sonst alle 5 cm. Daß die Methode mit großen Schmerzen verbunden ist, beweist der Umstand, daß einzelne Patienten in den ersten Tagen Morphinum bekommen mußten. Auch diese Methode ist für tiefe Varicen unanwendbar.

Brewitt (5) bespricht auf der Versammlung der Norddeutschen Chirurgen die Tavel'sche Methode, die er seit $2\frac{1}{2}$ Jahren anwandte. Er referierte über 50 rezidivfreie Fälle. Periphere Injektionen mit 1%iger Jodjodkalilösung machte Schiassi (32). Er legt die Saphena oberhalb des Knies auf 10 cm frei und unterbindet das zentrale Gefäß. Nach ca. 8 Tagen sollen die Venen nur noch zarte Ringe sein. Die Methode soll schmerzlos und frei von unangenehmen Nebenwirkungen und Vergiftungserscheinungen sein. Kontraindiziert ist das Verfahren bei Thrombosen und Ulcus cruris.

Am Anfang der 70er Jahre empfahl Nußbaum (26) die Circumschneidung der Ulcera. Er umschneidet in großer Entfernung von den Geschwürswänden in der gesunden Haut kreisförmig und hielt den Wundrand durch Tamponade klaffend. Credé ahmte die Nußbaumsche Methode nach, nur umschneidet er nicht kreisförmig, sondern er machte Bogenschnitte, die bis auf die Fascie reichten. Der Erfolg dieser beiden Methoden liegt hauptsächlich in der

Veränderung der Zirkulationsverhältnisse und weniger in der Entspannung der Geschwürswände, denn die bisher benutzten Venen, die am Ende der Saphena magna ihr Blut zugeführt hätten, sind obliteriert; ihr Blut tritt nun durch die klappenbesetzten Venae communicantes und die Fascie in die Vena femoralis, die nachgewiesenermaßen stets Klappen besitzt. Durch die Muskelkontraktionen ist, wie viele Autoren hervorheben, die Zirkulation in den Ästen der Vena femoralis erleichtert. Auf dem Geschwür ruht nun nicht mehr der Druck, der in der Saphena magna herrschte. Wenzel machte, um den Kollateralkreislauf auszuschalten, zwischen mittlerem und unterem Drittel des Oberschenkels einen auf die Fascie gehenden Zirkulärschnitt unter möglicher Schonung der Hautnerven und unterbindet alle über der Fascie liegenden Venen. Die Wunde wird mit Naht geschlossen. Die drei von Geor g é nach der Wenzelschen Methode operierten Fälle heilten zwar alle nach der Operation, doch gibt er leider nicht die Zeit an, die seit der Operation verflossen ist. Er selbst nennt die Wenzelsche Operation eine annähernd sichere Behandlungsmethode.

Schede (1893) und Moreschi (1894) haben zwei Zirkulärschnitte am Unterschenkel gemacht, von denen der eine oberhalb, der andere unterhalb des Geschwürs verlief. Schede hat sein Verfahren erst 1897 durch Perthes veröffentlicht. Schede nähte die Wunde, während Moreschi sie per granulationem heilen ließ. Zu bedenken gibt die Art des Schnittes, da ja die Beschaffenheit der Haut in der Nähe der Geschwüre fast immer mehr oder weniger verändert ist und die Heilung verzögern kann. Wieder aber abweichend von den eben Genannten machte Brauelt keinen zirkulären, sondern den hufeisenförmigen Schnitt, und zwar nur oberhalb des Geschwürs.

Einen wesentlich größeren, ja den größten Eingriff stellt die Operation nach Rindfleisch dar. Sein Assistent Friedel (11) hat dieselbe veröffentlicht. Nach dieser Methode werden am Unterschenkel, ja sogar noch im unteren Teil des Oberschenkels Spiraltouren bis auf die Fascie gemacht. Die unterste Spirale verläuft unterhalb des äußeren Knöchels über den Fußrücken. Die einzelnen Spiralen liegen 6—10 cm weit auseinander. Ein etwa vorhandenes Ulcus kommt zwischen zwei Spiralen zu liegen. In einzelnen Fällen wurden bis zu 14 Spiralen gemacht. Vorher findet die Resektion der Saphena im Scarpaschen Dreieck statt.

Stieda (31) berichtete auf dem Kongreß der Deutschen Ge

schaft für Chirurgie über 2 Fälle von Unterschenkelvaricen (keine Era), die er durch Spiralschnitt zur Heilung brachte. Ebenso berichtet Gleiwitz (13) über 6 Fälle, bei denen in der Garréschen Technik die Operation nach Rindfleisch vorgenommen wurde. Die Heilung dauerte 6—10 Wochen, bei einem Patienten sogar 5 Monate. Nach 1½—2 Jahren jedoch waren keine Geschwüre oder Ödeme oder Sensibilitätsstörungen vorhanden. Die Narben waren fest. Da manche Autoren die Operation genau nach den Angaben Rindfleischs als zu eingreifend erschien, so machten sie Abweichungen, erzielten jedoch nie den gewünschten Erfolg. So wandte Pollack (14) in 10 Fällen die Rindfleisch-Operation an. Bestanden Geschwüre, so verfuhr er genau nach Rindfleisch und war mit dem Erfolg zufrieden, während er in den Fällen, wo er die Geschwüre vorher zur Heilung gebracht hatte oder wo keine Geschwüre bestanden, und er die klaffenden Wunden durch die Naht schloß, nur ungünstige Erfolge hatte. Pollack hatte nur bei positivem Trendelenburg-Phänomen durch die Trendelenburgsche Operation Erfolg, während er sonst auch nach ausgedehnten Exstirpationen schon nach kurzer Zeit die alten subjektiven Beschwerden und Rezidive beobachtet hatte. Deshalb entschloß er sich zur Operation nach Rindfleisch.

Ebenso versuchte Bircher (3) die Heilungsdauer durch die Längsnäht abzukürzen und hatte dadurch „die denkbar ungünstigen Erfolge“. Rauch (30) berichtet über 8 Fälle von 5 Patienten, bei denen ebenfalls die Operation nach Rindfleisch vorgenommen wurde. Die Heilungsdauer betrug bis zu 14½ Monaten. Die Rindfleischsche Methode wurde streng eingehalten und die Schnitte gingen bis auf die Fascie. Die Äußerungen Rauchs sind, ganz abgesehen von der langen Heilungsdauer (bis 14½ Monate), nicht sehr ermutigend. Er sagt, daß der erste Verbandwechsel „äußerst schmerzhaft“ zu sein pflegt, so daß vorher eine Morphininjektion gegeben werden muß. Nach durchschnittlich 10 Tagen begann die Lapisbehandlung und nach durchschnittlich 5 Wochen konnten die Patienten aufstehen.

Kayser (20) berichtet über 18 Fälle bei 13 Patienten. Der Erfolg war in allen Fällen gut (einmal ein Ulcus-Rezidiv und einmal blieb das Ulcus nicht aus). Sein Urteil über die Operation selbst ist dagegen nicht ermutigend. Er schreibt darüber: „Die Operation stellt einen erheblichen Eingriff dar, der Allgemeinnarkose oder Kombiästhese erfordert, bei dem mächtige Wundflächen geschaffen und eine Menge an Blut- und Lymphbahnen eröffnet werden.“ Nach Kayser hebt die Nachbehandlung als sehr schmerzhaft hervor. Bei ihm betrug die Heilungsdauer 6 bis 13 Wochen bis zu völliger Erwerbsfähigkeit.

Lindemann (21) berichtet über 7 Fälle nach der Methode

von Rindfleisch. In 4 Fällen hielt er sich im Prinzip an die Operation nach Rindfleisch. Seine Erfolge waren keineswegs ermutigend, so daß er in seinem Schlußwort sagt: „Umschneidungen des Ulcus oder gar des ganzen Unterschenkels nach der Rindfleisch-Friedelschen Methode kann ich keineswegs empfehlen.“

Ledderhose ist mit dem Zirkel- oder Spiralschnitt ebenfalls nicht zufrieden wegen der später auftretenden Ödeme, die infolge ihrer Hartnäckigkeit sehr unangenehm werden können. Er befürwortet mehrfache Längsschnitte, die bei starken lymphatischen Ödemen sehr günstig wirken sollen, weil hierdurch die erweiterten Lymphbahnen zerstört werden. Tavel tadelt an der Operation nach Rindfleisch, daß sie „abscheuliche Narben hinterläßt, über die ein Chirurg sich schämen sollte“. Ein weiteres Urteil erübrigt sich wohl für die Empfehlung dieser Operation.

Von der falschen Ansicht, als ob die tiefen Venen nie varikös würden, ließ sich Cecca (9) leiten. Die Entfernung eines Venenstückes hielt er für wirkungslos und will durch seine Methode die *Vis a tergo* verstärken und der Erweiterung des Venenrohres vorbeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, verlagert er die Vena saphena magna und parva unter die Fascie oder intra- und submuskulär unter den Adduktor oder den Sartorius. Auf alle Fälle dürfte diese Methode zeitraubend und, da von falschen Motiven geleitet, auch von dementsprechendem Erfolg sein.

Katzenstein führte dieselbe Operation aus. Seine Erwägungen waren: Die Vena femoralis hat durch die Tätigkeit der umgebenden Muskeln Eigendruck; dagegen ist in der Vena saphena, weil unter der Haut liegend, kaum Druck vorhanden. Infolgedessen legt er die Saphena in die Muskulatur, ähnlich wie Cecca. Viele Anhänger scheint diese Methode nicht gefunden zu haben, ebenso wie die folgenden, die ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen möchte:

Mamourian verfährt bei seiner Operation folgendermaßen: Nachdem die Venen der unteren Extremität durch Elevation blutleer gemacht sind, wird durch einen kleinen Querschnitt die Saphena dicht bei ihrer Einmündung in die Femoralis bloßgelegt und abgebunden. Ein zweiter Einschnitt an der Innenseite des Knies legt die Vene bloß und hier wird die Vene doppelt abgeklemmt und durchschnitten. Eine mit Ohr versehene Sonde wird durch die Vene zum ersten Einschnitt durchgeführt, die Vene durchschnitten und mit der Sonde verbunden.

sch Zug wird nun die Vene umgestülpt und nach unten durch hergezogen. Bei gewundenen Venen benutzt Mamourian einen Mikrokatheter von kleinem Durchmesser. Bei geschlängelten Varixen ist die Methode nicht verwendbar. Die Blutung soll gering sein, weil beim Herausziehen die abgehenden Äste abgedreht und geschlossen werden. Während Mamourian seine Sonde von unten nach oben führt und die Venen von oben nach unten herauszieht, geht es Vaquié (37) umgekehrt. Er benutzt einen federnden Draht mit einer quergestreiften Olive, an diese Olive wird das freie Ende der Vene angebunden und die Vene stülpt sich dabei wie ein Handschuhfinger. Durch Massage entfernt er den eventuell tretenden Bluterguß.

Mamourian und Vaquié reißen die Vene des Oberschenkels in toto aus. Holfelder (18) dagegen operiert mit kleinsten Schnitten. Er läßt den Patienten stehen, bezeichnet die Stellen, unter denen große Varicen sichtbar sind, mit Methylenblau. Dann legt er 2 cm große Schnitte an, legt die Vene frei, faßt sie mit Kocher-Klammern, durchtrennt die Vene, die vorher peinlichst von dem anderen Gewebe isoliert sein muß und reißt dann die Vene distal- und zentralwärts in drehender Bewegung heraus. Die Intima reißt sich beim Abreißen ein.

Während die angeführten Autoren so ziemlich alle nur eine Operationsmethode übten und empfahlen, übte Pandolfini (28) verschiedene Methoden. Er machte 19 mal die Unterbindung und partielle Exstirpation der Saphena magna nach Trendelenburg; 1 mal zirkuläre Incisionen; 2 mal partielle Exstirpation der am meisten hervortretenden Venen und 2 mal die Madelung'sche Operation. Mit jedem Resultat ist er zufrieden, nur zwei Fälle wiesen ein Rezidiv auf. Seine Folgerung ist: Die Unterbindung und partielle Resektion reicht in den meisten Fällen nicht aus; bei ausgedehnter Varizenbildung empfiehlt er neben ausgedehnten Excisionen die zirkuläre Umschneidung.

Cignozzi (7) hatte bei seinen Operationen mit der totalen Exstirpation der Saphena vom Foramen ovale bis zur Knöchelgegend, mit eventuellem Parallelschnitt, die besten Resultate. 85 derartig operierte Fälle ergaben 8 Proz. Rezidiv; 33 Unterbindungen der Saphena 10 Proz. Rezidiv; 21 Unterbindungen mit gleichzeitiger Teilresektion der Saphena 3 Proz. Rezidiv und zirkuläre Incisionen nach Breschi zwei Rezidive und einen Todesfall (Embolie). Leider ist nicht angegeben, wie weit die Varicen vorgeschritten waren und ob eventuell durch sie bedingte weitere Störungen, wie Ekzeme und Ulcera, bestanden.

Algrave (1) hat eben bei Ekzemen und Geschwüren Bedenken gegen die totale Resektion geltend gemacht, da trotz Joddesinfektion Infektionen entstehen können. Des weiteren fürchtet er die Hämatom-

bildung trotz sorgfältigster Blutstillung und Nekrose der Wundränder, da ja die Struktur der Haut durch die varikösen Gebilde sehr verändert ist. Trotz dieser unangenehmen Erscheinungen hält er alle diese Bedenken für nicht schwer genug, um von der Operation Abstand nehmen zu sollen, denn bei gründlichem Vorgehen sind die Erfolge vorzügliche. Der günstigste Moment für die Operation ist die Zeit vor dem Auftreten stärkerer Ekzeme und größerer Geschwüre und ehe die Varicen schmerzhaft sind.

Bergasse (2) kommt ebenfalls zu dem Resultat, daß nur die operative Behandlung Aussicht auf Erfolg und Heilung haben kann. Auch er ist der Ansicht, daß nur die totale Exstirpation der Saphena interna vollen Erfolg haben kann. Die Exstirpation muß vom Scarpaschen Dreieck bis zum inneren Knöchel reichen. Bei Varicenbildung der Saphena externa hat auch die Resektion dieser Vene von der Ferse bis zum Knie zu erfolgen. Anastomosierende und perforierende Venen sollten möglichst peripher und sorgfältig unterbunden werden.

Moro führt das Bestehen der Varicen ebenfalls auf Schlußunfähigkeit der Venenklappen zurück. Besteht die Schlußunfähigkeit nur an der Einmündungsstelle der Saphena in die Femoralis, so genügt die Trendelenburgsche Operation. Die Venae communicantes haben auch häufig Klappen und wenn diese ebenfalls schlußunfähig sind, so müssen die mit undichten Klappen erschienenen Varicen später in anderen Sitzungen operiert werden. Mit seinem Resultat ist Moro zufrieden, nur haben sich einige Patienten zu späteren Operationen nicht mehr eingefunden.

Soviel von den Operationen, die seit der Entdeckung Trendelenburgs in der Varicenbehandlung am meisten empfohlen und geübt wurden.

Wie schon eingangs angeführt, waren die Ärzte des grauen Altertums bemüht, Varixoperationen auszuführen, um so den bemitleidenswerten Patienten Hilfe und Heilung zu bringen. So übte Oribasius, der von 325—403 kaiserlicher Leibarzt in Byzanz war, eine Operationsmethode, die für die von Narath (24) empfohlene Operation vorbildlich war. Im 6. Jahrhundert erwähnt Paulus von Ägina die Operation nach Oribasius. Im 10. Jahrhundert findet sich die Operation bei dem Araber Abulkassim etwas anders als nach Oribasius geschildert. Guy de Chauliac im 14. und Pietro d'Argellata im 15. Jahrhundert erwähnen die Abulkassimsche Venenoperation und bis auf Narath findet sich nirgends mehr eine genauere Erwähnung der Operation, die Oribasius empfohlen hatte.

Ohne anfangs die von Oribasius empfohlene Operation

kennen, kam N a r a t h auf dieselbe Methode. N a r a t h machte durch kleine Knopflöcher in der Haut eine subkutane Divulsio des ganzen Venenstückes. Er benutzte keine Esmarchsche Blutleere, da es für gut findet zu wissen, woher es blutet, und man so Embolien verhindern kann. Bei größeren Seitenästen wird über der Einmündungsstelle eine Incision gemacht und wie bei den Hauptästen verfahren. Kleinere Seitenäste können unberücksichtigt bleiben. Das Oberschenkelstück wird in der Richtung von oben nach unten entfernt. Embolien, Thrombosen und Hämatoeme beobachtete N a r a t h nie und da die Hautwunden nur klein sind, erfolgt die Heilung per primam intentionem. In der Literatur findet sich wenig über die Narathsche Operation. K u z m i k gibt zu, daß die Madelungsche Operation die radikalste ist, da nach seiner Ansicht ein Rezidiv ausgeschlossen ist und rühmt an der Narathschen Operation, daß sie in bezug auf Erfolg die gleichen Ansprüche zu machen kann wie die Madelungsche.

Colmers, der ein Schüler von N a r a t h ist, führt die Operation am Landkrankenhaus in Coburg in folgender Weise an: Die Operation wird in Lokalanästhesie vorgenommen. Von Quaddeln, die etwa je 10 cm voneinander entfernt sind, wird das ganze Operationsgebiet von der Schenkelbeuge bis zu den Knöcheln mit $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ proz. Novokain-Kochsalz-Kaliumsulfatlösung angespritzt. Der so entstandene Längsstreifen wird zur Erzielung einer vollkommenen Anästhesie in horizontaler Richtung von Quaddel zu Quaddel, also auch im Abstände von je 10 cm untergespritzt, so daß sich das Operationsgebiet aus einer Reihe von umspritzten Feldern von etwa 10 cm im Geviert zusammensetzt. Im ganzen werden selten mehr wie 200 bis höchstens 250 ccm Novokainlösung verbraucht.

Zunächst wird die Vena saphena durch einen kurzen horizontalen Schnitt an ihrer Einmündungsstelle freigelegt, isoliert, durchschnitten und zentral unterbunden. Der periphere Teil wird angeheftet, die Haut wird peripherwärts mit einem stumpfen Instrument abgetrennt und die Vene von dem anhaftenden Fettgewebe durch Abschaben desselben befreit. Etwaige Seitenäste werden gefaßt, die Strecke mit vorgezogen und unterbunden, sodann wird die Vene angespannt; man fühlt unter der Haut deutlich ihren Verlauf.

Etwa 10—12 cm unterhalb der ersten Incision wird eine weitere etwa 5 cm lange horizontale Incision angelegt, die Vene wird aufgesucht, gefaßt und nach Anlegung einer Klammer an der peripheren Seite wird jetzt das zentrale Ende durch Unterminierung der Haut freigemacht und aus der Wunde herausgezogen. Verschuß der oberen Wunde durch Michelsche Klammern. Nun wird die Vene in gleicher Weise nach abwärts verfolgt, in etwa gleichen Abständen werden Schnitte über ihr angelegt, um sie in dieser Weise im ganzen zu exstirpieren. Um eine Verschmutzung der subkutanen Wunde durch wiederholtes Hindurchziehen zu vermeiden, wird das jeweilig durchgezogene Venenstück jedesmal abgetragen. Finden sich stärkere Seitenäste, so werden sie in gleicher Weise verfolgt, von weiteren kleineren, entsprechend angelegten Einschnitten freigelegt und exstirpiert. Am Unterschenkel, wo sich oft große Knäuel von Varicen finden, werden die queren Schnitte je nach Bedarf etwas länger gestaltet und die Varixpakete mit dem Fettgewebe zusammen exstirpiert, um ein längeres Präparieren der sehr dünnen und zerreißlichen Knoten zu vermeiden. Sind Geschwüre vorhanden, so wird die Vene bis in die unmittelbare Nachbarschaft der Geschwüre verfolgt. Bei vorhandenen Geschwüren sind wegen der Infektionsgefahr die untersten Einschnitte offen zu halten, oder zum mindesten zu drainieren. Finden sich an der Außenseite des Unterschenkels im Gebiet der Vena saphena parva ebenfalls Varixknoten, so werden auch diese unter erneuter Umspritzung des betreffenden Gebiets in gleicher Weise entfernt. Nach Beendigung der Operation werden die Wunden mit Mastixlösung bestrichen und mit kleinen Mullstücken verklebt. Polsterung des ganzen Beines, Hochlagerung desselben auf einer langen Volkmannschen Schiene, die am dritten Tage nach der Operation fortgelassen wird. Handelt es sich um einen Fall, der nicht mit Geschwüren verbunden ist, so werden nach sechs Tagen die Klammern bzw. die Naht entfernt. Am achten Tage steht der Kranke auf. Sind Geschwüre vorhanden, so werden diese nach Heilung der Operationswunde in üblicher Weise mit Bettruhe und täglichen Bädern weiter behandelt.

Auf diese Weise wurden am Landkrankenhaus zu Coburg an 41 Patienten 47 Operationen seit dem Jahre 1910 ausgeführt. Zuvor will ich die einzelnen Krankengeschichten in Tabellenform

führen, wobei ich gleich bemerken möchte, daß ich die nach-
untersuchten Fälle etwas genauer und zugleich den Befund der
Nachuntersuchung schildern werde:

19 Operierte gaben schriftlich Antwort.

Nachuntersucht wurden 15 Patienten mit 17 Operationen.
Von den Nachuntersuchten und Soldaten wurden operiert 4 im
Jahre 1910, 3 im Jahre 1912, 1 im Jahre 1913, 2 im Jahre 1914
und 5 im Jahre 1916. Eigentliche Beschwerden und Rezidive wies
keiner auf. Mit der Operation sind alle zufrieden und alle schil-
dern ihren Zustand als wesentlich besser als vor der Operation.
An die einzelnen Patienten wurden Fragebogen versandt mit der
Erforderung entweder zur Nachuntersuchung zu kommen oder
die Fragen zu beantworten, die folgendermaßen lauteten:

[Anstatt der Fragen, sind in der Tabelle die rubrizierenden
Buchstaben gebraucht.]

- a) Bestehen noch Beschwerden und welche?
- b) Haben sich an dem operierten Bein neue Krampfadern ge-
bildet?
- c) Besteht noch dauernd oder vorübergehend Geschwürsbildung?
- d) Haben Sie nach der Operation irgendwelche Mittel, wie Bin-
denwicklung, Gummistrumpf angewendet?
- e) Wie sind Sie mit dem Erfolg der Operation zufrieden?

Neun Männer waren zu den Fahnen geeilt und dienen vor
dem Feinde dem Vaterlande. Die Antworten aus dem Felde
drücken alle die volle Zufriedenheit mit der Operation aus und
viele fügen nochmals ihren herzlichen Dank bei für die Hilfe,
die ihnen durch die Operation zuteil wurde. Von diesen 9 Soldaten
darf man zweifelsohne annehmen, daß ihre Beschwerden behoben
sind, denn sonst wären sie in einer Garnison untergebracht, oder
gar militärfrei.

Sieben Patienten gaben keine Antwort. Von manchen darf an-
genommen werden, daß sie unterdessen gestorben sind, da in der
Krankengeschichte noch andere Leiden, wie Carcinom usw. ange-
führt waren.

Sämtliche Operationen wurden in Lokalanästhesie ausgeführt
mit Ausnahme der Fälle 9 und 11. Fall 9 ist der einzige, bei dem
Chloroformnarkose angewendet wurde; ein Grund hierfür ist leider
in der Krankengeschichte nicht angegeben. Fall 11 wurde in leicht-
er Äthernarkose gemacht, da die Patientin schon bei Ausführung

Jahrgang	Beruf, Name und Alter	Dauer der Varicen	Ulcus und seit wann?	Operation. Wie lange Kranken- hausaufenthalt?
1910. 1.	E. L., 19 J. alt, Metzger.	Seit $\frac{3}{4}$ Jahr. Schlag vom Rinderhuf	nein	8. II. Operation 23. II. geheilt entl.
„ 2.	S. Sch., 53 J. alt, Ehefrau.	Ohne besondere Angabe	ja	3. IV. Operation. 30. IV. geh. entl.
„ 3.	N. B., 63 J. alt, Bauer.	Vor 20 Jahren Typhus, seit 18 Jahren Varicen	ja. Seit ca. 18 Jahren	12. XI. Operation. 2. XII. ohne sonst. Defekt entl.
„ 4.	R. Sch., 47 J. alt, Tischler.	Seit 20 Jahren Varicen	ja	5. IX. Operation. 3. X. geheilt entlassen
„ 5.	L. G., 59 J. alt, Aufwärterin.	Seit vielen Jah- ren Ulcera	ja. Seit vielen Jahren l. Ober- schenkel 10 cm großes Ulcus.	21. IX. Operat. 11. X. entl.
„ 6.	F. D., 54 J. alt, Wäscherin	Seit langer Zeit	15 cm langes Ulcus, vollstän- dig gangränöse Partien	5. IX. Operation. 3. X. entlassen
1912. 7.	E. W., 37 J. alt, Pferdeknecht.	Seit mehreren Jahren Ulcera und Varicen	Seit einigen Jahren	25. I.—10. II. l. Bein. 10. II. Wunden geheilt. 26. II. r. Bein.
„ 8.	J. E., 67 J. alt, Landwirt.	Ohne bestimmte Angaben	Seit 10 Jahren	6. III. geh. entl. Operation nicht typisch nach Narath. 24. IX. 12. Operat. 2. I. 13. entl.
1913. 9.	R. G., 24 J. alt, Metzger.	Seit 5 Jahren Varicen	Seit $\frac{1}{2}$ Jahr	18. II. Operat. 24. II. Verbandw. 2. III. Pat. steht auf 8. III. entlassen. Varicenoperat. gut verlaufen.

b	c	d	e	Bemerkungen
Ohne Nachricht				Befindet sich zurzeit im Felde. Soldat.
nein	Seit 3 Jahren nicht mehr	nein	ja, sehr	Pat. hat keine Beschwerden mehr. Es haben sich an dem operierten Bein keine Krampfadern und Geschwüre gebildet. Sie ist mit dem Erfolg der Operation sehr zufrieden. Bläulich livide Verfärbung des ganzen Unterschenkels. Im unteren Drittel desselben große Hautnarben, stark abschilfernd. Nirgends ein Geschwür. Ist mit dem Erfolg der Operation sehr zufrieden.
nein nein	ja, zeitweilig	nein	ja, sehr	
Nachuntersucht!				
nein	nein	ja, nach ca. $\frac{3}{4}$ Jahren	ja, sehr	Narben reaktionslos verh. Keinerlei Beschwerden bei Anstrengung. Mit dem Erfolg der Operat. zufrieden.
nein	nein	nicht mehr lange	ja, sehr	
nein	nein	nein	ja	
Nachuntersucht!				Durch Dacryocystitis wurde die Operation verzögert, da Pat. auf eine Augenstation verlegt worden ist.
nein	nein	nein	ja	Wunden eiterten. Am Unterschenkel Bogenschnitt m. Konvexität. Jetzt beschwerdefrei. Nach dem Krieg will Pat. sich das andere Bein operieren lassen. Chloroform-Narkose. Soldat.

Jahrgang	Beruf, Name und Alter	Dauer der Varicen	Ulcus und seit wann?	Operation. Wie lange Kranken- hausaufenthalt?
1913. 10.	L. G., 72 J. alt, Bauer.	Seit vielen Jahren	ja	26. II. Operation 3. III. Klammer entf. 10. III. geh. entl.
„ 11.	E. M., 53 J. alt, Tagelöhnerin.	Seit längerer Zeit	Seit 3 Wochen	11. III. Operat. 16. III. Klammer entf. 25. III. geh. entl.
„ 12.	A. G., 53 J. alt, Bäcker.	Seit 15—20 J. Varicen beiderseits	nein	1. IV.—11. IV. Bein. Be- schwerdefrei entl.
„ 13.	St. K., 53 J. alt, Kutscher.	Seit langer Zeit beiderseits sehr starke Varicen	Beiderseits mehrere bis über fünfmarkstück- groß	18. III. Operation 1. Bein. 4. IV. entl.
„ 14.	A. L., 24 J. alt, Dienstmädchen.	Vor 1 Jahr weg. Varicen schon anderweitig ope- riert. In letzter Zeit Rezidiv	An beiden Unterschenkeln fünfmarkstück- großes Geschwür schmierig be- legt. Nekrotische Partien	15. III. 1. Bein Ven. magn. be- der Operatio völlig thron bosiert. 9. IV. 1. Bein 17. IV. steht au 26. IV. entl. Noc ein kleiner Ep theldefekt.
„ 15.	A. St., 43 J. alt, Stuckateur.	Seit 15 Jahren infolge Kratzens Seit einigen Tagen Thrombo- phlebitis	nein	19. VI. Operation 24. VI. Klammer entfernt. 7. VII. geh. entl.
„ 16.	E. R., 22 J. alt, Dienstmädchen.	Seit 2 Jahren	nein	28. V. Operation 5. VI. p. p. He- lung. Steht au 13. VI. entlass mit Binden.
1914. 17.	E. St., 47 J. alt, Erdarbeiter.	Mehrere Jahre	Ekzem i. d. Knöchelgegend	26. VI. Operation 3. VII. Klammer entfernt. 19. VII. geh. entl.
„ 18.	D. B., 62 J. alt, Tischler.	Seit langer Zeit	Wegen Ulcera 1912—13 im Krankenhaus aufgenommen	8. VI. Operation 16. VI. Klam- mern entfernt 20. VI. geh. entl.

	b	c	d	e	Bemerkungen
					Ohne Nachricht!
					Wurde wegen eines Kan- kroids der Nase mit Röntgenstrahlen behand-
					Nachuntersucht!
					Keinerlei Beschwerden, keine Geschwüre mehr. Narben fast völlig un- sichtbar. Kann ihren Beruf als Tagelöhnerin schwerefrei nachgehen.
					Nachuntersucht!
					Vollkommen beschwerde- frei. Narben kaum mehr sichtbar. Pat. nie Binden getragen. Er wird sich nach dem Kriege das andere Bein operieren lassen. Versieht die ganze Zeit seinen Dienst als Bäcker.
					Ohne Nachricht!
					Schon einmal anderweitig wegen Varicen operiert.
in	nein	nein	Nach ca. $\frac{1}{2}$ Jahr	ja	
in	nein	nein	Nach ca. $\frac{1}{2}$ Jahr	ja	
in	nein	nein	Nach einigen Monaten	ja	
					Ohne Nachricht!
					Nachuntersucht!
					Geschwüre gut verheilt. Haut in der unteren Hälfte des Unterschen- kels stark pigmentiert u. abschilfernd, sonst keine Beschwerden.

Jahrgang	Beruf, Name und Alter	Dauer der Varicen	Ulcus und seit wann?	Operation. Wie lange Kranken- hausaufenthalt?
1914. 19.	A. B., 31 J. alt, Landwirt.	Mehrere Jahre	Ohne Angaben	8. V. Operation. 16. V. p. p. geheilt. Furunkel. Achselhöhle.
„ 20.	A. St., 22 J. alt, Former.	Seit 15 Jahren	nein	8. VI. geheilt entl. 12. V. Operation. 18. V. Klammern entfernt.
„ 21.	K. M., 70 J. alt, Gärtner.	Seit 35 Jahren Varicen	Seit ca. 20 Jahren Ulcus	23. VI. geh. entl. 15. IV. Operation. 22. IV. Klammern entfernt. 26. IV. Ulcus ver- kleinert sich.
„ 22.	S. S., 19 J. alt, Plätterin.	Seit 3 Jahren Varicen	Am l. Unter- schenkel zwei- markstück- großes Geschw.	3. V. geh. entl. 24. IV. Operation. 29. IV. Klammern entfernt.
„ 23.	E. Sch. Porzellanmalerin	Seit mehreren Jahren	nein	8. V. geh. entl. 8. IV. Operation. 15. IV. Klammern entfernt. 25. IV. geh. entl.
„ 24.	J. A., 59 J. alt, Landwirt.	Seit 20 Jahren	Seit 20 Jahren	13. III. Operation. 20. III. Klammern entf.
„ 25.	M. M., 47 J. alt, Landwirt.	Seit 10 Jahren	In den letzten Jahren	17. IV. entlassen. 11. XI. Operat. 20. XI. Klammern entfernt.
„ 26.	J. G., 27 J. alt, Arbeiter.	Seit einigen Jahren	nein	Heilung p. p. 14. IV. Operation. 16. IV. Klammern entfernt.
1915. 27.	P. St., 48 J. alt, Tagelöhner	Seit vielen Jahren	Seit mehreren Jahren	24. IV. geh. entl. 5. V. Op. l. Bein. 14. V. Klammern entfernt.
„ 28.	E. P., 21 J. alt, Landwirt.	Seit 1 Jahr	nein	19. V. Heilung. pp. 22. V. r. Bein. 28. V. Kl. entf. 5. VI. geh. entl. 4. VI. Operation. 9. VI. Kl. entf.
„ 29.	A., 46 J. alt, Ziegelarbeiter.	Seit ca. 18 Jahren	Seit ca. 5 Jahren beiderseits	15. VI. geh. entl. 24. VIII. Op. l. B. 29. VIII. Kl. entf. 2. IX. pp. Heilung. 6. IX. Op. r. Bein. 11. IX. Kl. entf. 17. IX. p. p. entl.

b	c	d	e	Bemerkungen
nein	nein	nein	ja	Zugleich Herniotomie. Soldat.
Ohne Nachricht!				In der Jugend Pneumonie.
Nachuntersucht!				Keinerlei Beschwerden, ar- beitet als Gärtner. Die Stellen des Ulcus stark abschilfernd. Mit der Operation sehr zufrieden.
Ohne Nachricht!				
Nachuntersucht!				Vor 3 Jahren Operation. Narben blaß und reizlos, nirgends ein Rezidiv. Nach der Operation hat die Pat. ein Kind gehabt. Seit der Operation sei das Bein nicht wieder ange- schwollen.
Ohne Nachricht!				Vor ca. 20 Jahren Typhus. Ulcera heilten sehr lang- sam.
Ohne Nachricht!				Bekam nach Operat. Pneu- monie und blieb bis 1. II. 15 im Krankenhause.
nein	nein	nein	nein	Soldat.
Nachuntersucht!				Alles gut geheilt, keinerlei Rezidive, keinerlei Schmerzen, trägt seit ca. 1½ Jahren keine Binden mehr.
nein	nein	nein	sehr	Soldat.
nein	nein	nein	sehr	

Jahrgang	Beruf, Name und Alter	Dauer der Varicen	Ulcus und seit wann?	Operation. Wie lange Kranken- hausaufenthalt?
1915. 30.	A. S., 25 J. alt, ohne Beruf.	Am r. Bein Varicen	nein	13. XI. Opera 18. XI. Kl. entl.
„ 31.	M. M., 35 J. alt, Dienstmädchen.	Seit ca. 10 Jahren.	R. Unterschen- kel, talergroß	13. XI. Operat 18. XI. Klammer entfernt. 20. XI. Pleuritis. 2. XII. geh. entl.
„ 32.	A. R., 56 J. alt, Ehefrau.	Seit langer Zeit	ja. in den letzten Jahren	5. XI. Operation. 9. XI. Kl. entl. 6. XII. geh. entl.
„ 33.	A. F., Gärtner.	Seit 20 Jahren	nein	
„ 34.	P. D., 47 J. alt, Arbeiter.	Mehrere Jahre	Seit einigen Jahren walnuß- großes Geschwür am Unterschenkel In letzter Zeit	27. XI. Operat. 4. XII. Kl. entf. 8. XII. in ambu- lante Behandl. entlassen.
„ 35.	E. W., 58 J. alt, Tagelöhnerin.	Beiderseits Va- ricen. Es be- stehen Beschwer- den seit vielen Jahren		20. XI. Operat. 25. XI. Kl. entl. 6. XII. geh. entl.
„ 36.	M. W., 33 J. alt, Arbeiterin.	Seit einigen Jahren	L. Unterschenkel mehrere Ge- schwüre	9. XII. Operation. 13. XII. Kl. entl.
1916. 37.	A. L., 47 J. alt, Arbeiterin.	Seit mehreren Jahren	Seit 1 Jahr l. Unterschenkel- geschwür, fünf- markstückgroß Ulcus	12. I. geh. entl. 27. XI. Operat. 4. XII. Kl. entf. Furunkel in der Unterbauch- gegend.
„ 38.	A. O., 68, J. alt Ehefrau.	Seit vielen Jahren	Seit mehreren Jahren	8. I. geh. entl. 12. IX. Operation
„ 39.	N. W., 68 J. alt, Landwirt.	Seit langen Jahren	nein	27. IX. geh. entl. 31. I. Operation 7. II. Kl. entf. 14. II. Wunder p.p. geh. 19. II. entlassen

	b	c	d	e	Bemerkungen
	nein	nein	nein	sehr	Narben reaktionslos, war ein Jahr in einer Lazarettküche tätig, wo sie den ganzen Tag stehen mußte. Gibt an, zeitweise noch Schmerzen zu haben.
	nein	nein	nein	nein	
	nein	nein	nein	sehr	Am Unterschenkel sind die Varicen subkutan entwickelt, daher großer Hautschnitt nötig, die Haut äußerst dünn. Zickzackwunde auf der Vorderseite der Tibia infolge schlechter Hauternährung. Langsame Heilung. Soldat! Auf Urlaub nachuntersucht. Hat keine Beschwerden mehr. Tut Dienst i. Schützengraben.
	Nachuntersucht!				
	nein	nein	nein	sehr	
	Nachuntersucht!				Hat keinerlei Beschwerden, arbeitet in der Landwirtschaft. Will sich nach dem Kriege das l. Bein operieren lassen.
	nein	nein	nein	nein	
	Nachuntersucht!				Keine Beschwerden mehr, trägt keine Binden mehr, arbeitet den ganzen Tag im früheren Beruf (in der Molkerei).
	Ohne Nachricht!				
	Ohne Nachricht!				Pat. ist verstorben.

Jahrgang	Beruf, Name und Alter	Dauer der Varicen	Ulcus und seit wann?	Operation. Wie lange Kranken- hausaufenthalt?
1916. 40.	M. Sch., 41 J. alt, Arbeiterin.	Ohne besondere Angaben	nein	21. VIII. Opera. 26. VIII. Kl. ent. 28. VIII. geh. ent.
„ 41.	K. W., Knecht.	Seit mehreren Jahren Ulcera und Varicen.	Seit einigen Jahren.	25. I. 12. Opera. 1. Bein. 1. II. 12. Klammern ent. 26. II. Op. r. Bein. 6. III. Kl. ent. 21. III. geh. ent.

der Lokalanästhesie sich sehr unvernünftig auführte. Die Zeitdauer betrug bei 47 Fällen 12 mal über 1 Stunde, 1 mal über $1\frac{3}{4}$ Stunden, 3 mal $1\frac{1}{2}$ Stunden, 8 mal zwischen über 60 und 80 Minuten, in 26 Fällen weniger als 1 Stunde. Die kürzeste Zeitdauer war 25 Minuten. Starker Blutverlust trat nie ein und ist nicht zu befürchten, da die einzelnen Venenstücke nach ihrer Freilegung mit Klemmen gefaßt und komprimiert und die Seitenäste gleich unterbunden werden. Die Wunden, abgesehen von den durch Ulcus veränderten Hautstellen, heilten stets per primam, so daß von nennenswertem Fieber nicht gesprochen werden kann. Thrombosen oder Nachblutungen sind in den Krankengeschichten keine erwähnt. In durchschnittlich 2—3 Wochen verließen die Patienten geheilt das Krankenhaus. Bestehen keine Ulcera, so kann der Patient in spätestens 11 Tagen wieder zu Hause sein, um nach einigen weiteren Wochen der Schonung seine gewohnte Tätigkeit wieder aufzunehmen. Die erste Zeit müssen die Patienten noch einige Zeit das operierte Bein binden, doch mit der Zeit können sie auf die Bindenwicklung der Beine verzichten. Wenn auch nicht jeder einzelne Fall, der nachuntersucht wurde, wirklich ideale Resultate zeitigte, so sind doch alle nachuntersuchten Patienten und diejenigen, die Antwort gaben, mit dem Resultat der Operation sehr zufrieden. Colmers verfährt genau nach Narath, nur daß Narath am Unterschenkel von unten nach oben und Colmers von oben nach unten die Venenabschnitte entfernt.

b .	c	d ⁺	e	Bemerkungen
nein	nein	nein	nein	
Nachuntersucht!				Am 1. Unterschenkel, der vom Assistenzarzt operiert wurde, entwickelte sich in den ersten Jahren ein Ast der Saphena parva zu einer stärkeren Vene, die jetzt thrombosiert ist und bei erneuter Aufnahme exstirpiert wurde. Sonst hatte Pat. keinerlei Beschwerden.

Berücksichtige ich die in der Literatur angeführten Methoden, so ist unbestritten die von N a r a t h empfohlene Operation, neben dem Vorzug die radikalste zu sein, wie K u z m i k anführt, auch die schonendste sein. Lästige Narben entstehen kaum, die Schnitte sind sehr kurz und gehen nur ins Unterhautzellgewebe. Infolgedessen wird die Verschieblichkeit und normale Dehnbarkeit der Haut nach ihrer Vernarbung in keiner Weise beeinträchtigt. Nach einigen Jahren sind die Narben kaum mehr sichtbar, abgesehen von den braunen Flecken, die bei bestehendem Ekzem und in dessen vorbereitendem Stadium, dem Ekzem, sich bilden haben, die mit der Operation ja in keinem Zusammenhang stehen.

Zieht man die angeführten Operationen in Betracht, so muß man staunen, wie man auf die eingreifenden Operationen verfallen ist, wie sie z. B. die Rindfleisch-Friedelsche Operation darstellen, oder sogar auf die Idee der lebensgefährlichen Operationen von Hesse und Schack oder Dobrowolskaja kommen ist. Wie über diese Operationen geurteilt wird, habe ich oben angeführt. Wie auch die anderen Autoren hervorheben, so ist die Narathsche Operation in den Fällen die schönsten Resultate zu erzielen, wo noch keine oder nur kleinere Ulcera vorhanden sind. Nicht zu unterschätzen ist ferner das Alter der einzelnen Patienten, die operiert wurden. Das Alter der einzelnen Patienten betrug zwischen 19 und 76 Jahren, und zwar waren: 3 Patienten

19 Jahre, 7 Patienten zwischen 20 und 30, 6 zwischen 30 und 40, je 8 zwischen 40 und 50 und 50 und 60 Jahren, 6 zwischen 60 und 70 und 2 über 70 Jahre. In Anbetracht der zuletzt erwähnten Patienten, glaube ich behaupten zu können, daß keine andere Methode schonender wäre und bei dem hohen Alter der Patienten deren Leben weniger gefährdete, als die von N a r a t h angegebene. Ist doch bei alten Leuten die Narkose stets von weittragender Bedeutung, aber Colmers hat nie Narkose angewandt mit Ausnahme des Falles 9, der in Chloroformnarkose operiert wurde ohne daß ein Grund hierfür angegeben ist, und des Falles 11, wo sich die Patientin schon bei Ausführung der Lokalanästhesie sehr unvernünftig benommen hatte.

Während manche Operationen sich nur für Varicen eignen und bei bestehendem Ulcus nicht anwendbar sind, hat Colmers unter seinen 41 Patienten 30 Fälle mit Ulcus; unter diesen sind Leute, die schon jahrzehntelang ihre Ulcera hatten.

Allerdings muß streng nach den Angaben von N a r a t h und Colmers verfahren werden, um kein unnötig langes Krankenzuhause zu erzielen, wie z. B. der Fall 8. Dieser Fall wurde in Abwesenheit von Colmers operiert und es wurde am Unterschenkel atypisch operiert. Patient mußte infolgedessen vom 24. IX.—2. I. des anderen Jahres im Krankenhause, also über 3 Monate, bleiben weil am Unterschenkel ein größerer Bogenschnitt mit der Komplexität nach unten gemacht wurde. Es bildete sich ein Hämatom das vereiterte.

Wohl meinten manche Patienten, die früheren Ulcera seien wieder etwas aufgebrochen, doch ein genaueres Ausfragen legte folgende Erwägung nahe: Nach Abheilung des Ulcus und nach Entlassung aus dem Krankenhause schilferte die Epidermis über dem Ulcus und in dessen Umgebung mehr als die andere Haut ab. Im Krankenhause und in der dem Krankenhause direkt nachfolgenden Zeit nehmen die Leute noch ihre regelmäßigen Fußbäder, auf die sie aber mit der Zeit verzichten zu können glauben. So bilden sich dicke Epidermisschuppen, die nicht mehr entfernt werden und unter denen dann die Haut natürlich näßt und ein Ulcus vortäuscht. Sobald die Leute einige Fußbäder genommen hatten, heilte das Ekzem und bei regelmäßigem Gebrauch von

Fußbädern traten keine neuen nässenden Stellen auf. Also nicht auf Kosten der Operation, sondern auf Kosten der hierzulande leider in bedenklicher Blüte stehenden Wasserscheu, sind diese genannten Geschwüre zu setzen. Zur weiteren Bekräftigung meiner Behauptung führe ich an, daß es stets Leute der unteren Schichten waren, die dieses unliebsame Ereignis traf und daß ich selbst Gelegenheit hatte, einen Fall mit Ulcus genauer zu beobachten:

38 jährige Frau, 1905 I. Partus, seither Varicen, die trotz Binden, Verbinden, Massage und Fußbädern anstatt besser, schlechter wurden. Seit diesem Jahr Ulcus. Am 22. VI. 1917 Operation des linken Beines, das im unteren Drittel des Unterschenkels schon ein kleines Ulcus seit einem Jahr hatte. Am 28. VI. Hämorrhoidenoperation und am 11. VII. Operation des rechten Beines, das nur Varicen aufwies. Am 18. VII. schon verließ die Patientin das Krankenhaus. Zu Hause schonte sich die Frau noch einige Zeit und wickelte nur noch das zuletzt operierte Bein. Auf jedes Vollbad hin bemerkte Patientin deutlich zunehmende Besserung und Kräftigung des rechten Beines — im linken hatte sie keine nennenswerten Beschwerden mehr — sodaß sie nach weiteren 3 Wochen auf die Bindenwicklung des rechten Beines verzichten konnte. Schon 14 Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhause war Patientin den ganzen Tag auf, versah ihren Dienst als Hausfrau und hatte keinerlei Beschwerden mehr.

Was bei den meisten Operierten fehlt, das ist eben die nötige Einsicht für unerläßliche Hautpflege und da darf es nicht wundernehmen, wenn bei solchen Leuten unter den alten Epidermischorfen eines abgeheilten Ulcus ein nässendes Ekzem mit etwas Weiterbildung sich etabliert.

Erwähnen möchte ich noch, daß die Vene nicht immer gleichmäßig erweitert war, sondern daß sie im unteren Drittel des Oberschenkels manchmal auffallend dünn wurde und sich zum Teil ganz im Gewebe verlor, wie Fall 24 und 33.

Was den Zeitraum zwischen Nachuntersuchung und Operation betrifft, so braucht es wohl keiner weiteren Erwähnung, wenn ich auf die vier im Jahre 1910 operierten Fälle hinweise, wo zur Zeit der Nachuntersuchung der jüngste Patient 54 und der älteste 60 Jahre alt war. Wenn in 7 Jahren sich kein Rezidiv bildete und die Leute mit ihrem Zustand je älter sie wurden, desto mehr zufrieden waren, so darf man in dem Erfolg der Operation wohl keine Zweifel setzen und erst recht nicht, nachdem infolge des Krieges doch jeder anstrengender als zuvor arbeiten muß und die

schwerste Arbeit eben den alten Männern, die nicht im Felde sind, überlassen wird.


Bevor ich zum Schlusse komme, sei es mir gestattet, Herrn Prof. Dr. Colmers für die liebenswürdige Überlassung des Materials und seine Anregung zu der Arbeit meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Alles in allem: Die Narathsche Operation ist im stande, nicht nur bei bestehenden Varicen, sondern auch bei Ulcera, die schon jahrzehntelang bestanden haben und bei ganz alten Leuten völlige Heilung zu bringen. Ihre Vorzüge hat Narath selbst schon bekannt gegeben und diese Arbeit hat, glaube ich, hierfür den unzweideutigen Beweis gebracht.

Literaturverzeichnis.

1. Alglave. Zentralbl. f. Chir. 1912, S. 1115.
2. Bergasse. Zentralbl. f. Chir. 1911, S. 1266.
3. Bircher, Zur Behandlung der Varicen und des Ulcus cruris. Zentralbl. f. Chir. 1911, S. 464.
4. Brodier. Zentralbl. f. Chir. 1907, S. 473.
5. Brewitt. Zentralbl. f. Chir. 1911, S. 1637.
6. Cecca. Zentralbl. f. Chir. 1909, S. 227.
7. Cignozzi. Zentralbl. f. Chir. 1912, S. 454.
8. Coenen. Zentralbl. f. Chir. 1912, S. 117.
9. Carlier. Zentralbl. f. Chir. 1905, S. 1095.
10. Dobrowolskaja, Über eine das Lumen der Gefäßanastomose erweiternde Methode der Venennaht. Beitr. f. klin. Chir. 1913, S. 426.
11. Friedel, G., Operat. z. Behandlung der Varicen, Elephantiasis und Ulcus cruris. Archiv f. klin. Chir. 1908, Bd. 86, S. 443.
12. Goerlich. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 44.
13. Gleiwitz. Münchn. med. Wochenschr. 1913, Nr. 23.
14. George, Zur Behandlung variköser Unterschenkelgeschwüre. Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 73, S. 546.
15. Gottschlich. Zentralbl. f. Chir. 1912, S. 428.
16. Hesse u. Schack, Die Saphena-Femorale-Anastomose, eine Überpflanzung der Vena saphena in die Vena femoralis mittels Gefäßnaht als operative Behandlungsmethode bei Varicen. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 85.
17. Hesse, Über ein palpatorisches Symptom der Klappeninsuffizienz bei beginnenden und nicht sichtbaren Varicen. Beitr. z. klin. Chir. 1913, Bd. 85.
18. Holfelder. Zentralbl. f. Chir. 1913, S. 1290.

- Kuzmík, Beitr. z. operativen Behandlung der Venenektasie der unteren Extremitäten. Beitr. z. klin. Chir. 1913, Bd. 84, S. 1.
- Kayser, Zur Behandlung des varikösen Symptomenkomplexes mit dem Spiralschnitt. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 68, S.
- Lindemann, Zur Behandlung der Unterschenkelgeschwüre. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1912, Bd. 114, S. 563.
- Moro, Über die Pathogenese und die zweckmäßigste Behandlung der Krampfadern der unteren Extremitäten. Klinische und experimentelle Untersuchungen. Beitr. z. klin. Chir. 1911, Bd. 71, S. 420.
- Myauchi. Langenbecks Archiv Bd. Heft 4.
- Narath, Über die subkutane Exstirpation ektatischer Venen der unteren Extremität. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1906, Bd. 83, S. 104.
- Nobl, Der variköse Symptomenkomplex. Urban & Schwarzenberg Wien 1910.
- Nußbaum, Neue Heilmethode b. Geschw. Ärztl. Int. Bl. München 1873, XX, S. 205—211.
- Pollack. Wien. klin. Wochenschr. 1911, Nr. 26.
- Pandolfini. Zentralbl. f. Chir. 1908, S. 32.
- Perthes, G., Über die Operation der Unterschenkelvaricen nach Trendelenburg. Deutsche med. Wochenschr. 1895, Nr. 16.
- Rauch, Die operative Behandlung von Varicositäten und Ulcera cruris mit dem Rindfleisch—Friedelschen Spiralschnitt. Beitr. z. klin. Chir. 1913, Bd. 86, S. 403.
- Stieda, Zur operativen Behandlung des Ulcus cruris varicosum. Reichs-Medizinalanzeiger Nr. 26.
- Schiassi. Zentralbl. f. Chir. 1909, S. 493.
- Tavel, Die Behandlung der Varicen durch d. künstl. Thrombose. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1912, Bd. 116, S. 735.
- Trendelenburg. a) Naturforscherversammlung 1907 in Leipzig.
b) Bruns' Beitr. z. klin. Chir. Bd. 7, S. 195.
- Unger. Berlin. klin. Wochenschr. 1911, Nr. 51.
- Viannay. Zentralbl. f. Chir. 1905, S. 651.
- Zanconi. Zentralbl. f. Chir. 1911, S. 1190.
-



Lebenslauf.

Ich Franz Eugen Stadel wurde am 1. Februar 1876 zu Rotteng a. Neckar geboren und besuchte in meiner Vaterstadt die Volks- und hernach die sechsklassige Lateinschule. Das Obermnasium absolvierte ich in Rottweil, wo ich im Juli 1896 das Zeugnis der Reife erhielt. Hierauf studierte ich 3 Semester Medizin zu Tübingen, diente dort im Januar 1897 mein 1. Halbjahr bei der Waffe. Vom Sommersemester 1898 ab studierte ich drei weitere Semester zu Berlin, wo ich mein Tentamen physicum ablegte. Vom Wintersemester 1899/1900 ab war ich zu Straßburg E. immatrikuliert, wo ich im Sommer 1902 mein Staatsexamen bestand. Daran anschließend diente ich ab 1. Oktober zu Ulm a. D. ein 2. Halbjahr als einj.-freiwill. Arzt und war dann bis Mitte Dezember 1903 an der Straßburger Universitäts-Frauenklinik, der Klinik für Hals-, Nasen- und Rachenkrankheiten sowie in der Juglingsfürsorge als Volontärarzt tätig. Seit Mitte Dezember 1903 bin ich in der Praxis tätig.

Druck von August Pries in Leipzig.

Druck von August Pries in Leipzig.
